

Bildiri No: P-206

Kategori: Dięer

SPORADİK DERİN VEN TROMBOZU İLE BAŞVURAN HASTADA PROSTAT KANSERİ OLABİLİR Mİ?

Sunum Tipi: Poster

İhsan ALUR, Kalp damar Cerrahisi, Denizli Devlet Hastanesi

Yusuf İzzettin ALİHANOĞLU, Kardiyoloji, Denizli Devlet Hastanesi

Ayça TAN, Patoloji, Denizli Devlet Hastanesi

Aydın KARABACAKOĞLU, Radyoloji, Denizli Devlet Hastanesi

Venöz Tromboemboli (VTE) ile kanser arasındaki ilişkiyi 1865 yılında ilk kez Trousseau tanımlamıştır. Aslında o açıklanamayan ve gezici tromboflebit için tanımlamıştır, fakat daha sonra bu tanımlama Trousseau's sendromu olarak kanser ve dięer tüm hiperkoagülabilité durumları için kullanılmıştır (1). VTE) [VTE: Derin Ven Trombozu (DVT) ve Pulmoner Embolizm (PE)] (2) kanser hastalarında sık görülen, morbidite ve mortaliteye [kanser hastalarında en yaygın ikinci ölüm nedeni] (3,4,5) neden olan önemli bir komplikasyondur (6). Kanser hastaları kanser tanısı konduktan sonraki birkaç ay içinde ve metastaz varlığında artmış venöz tromboemboli riskine sahiptirler (7). Kanser hastalığına baęlı hiperkoagülabilité, immobilizasyon, cerrahi işlem, kemoterapi ve/veya adjuvan hormon terapisi uygulamaları ve santral venöz kateter takılması en yaygın presipitan faktörlerdir (8). Bu vaka sunumunda, hikayesi sporadik derin ven trombozu klinięi ile başlayan ve prostat kanseri ile sonuçlanan bir hastayı sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler:
